









# Médicaments antiviraux VHC (voie orale)





## COMBINAISONS

Tous géotypes	<b>SOF+LDV</b>	<b>HARVONI®</b> (sofosbuvir + lépidasvir) GILEAD		1 comprimé (400mg de sofosbuvir + 90 mg de Ledipasvir) 1 fois/jour		Au cours ou en dehors d'un repas. Peut être prescrit seul ou associé à la ribavirine.
Géotypes 1 et 4	<b>OBV+PTV+RTV</b>	<b>VIEKIRAX®</b> (Ombitasvir + paritaprevir + ritonavir) ABBVIE		2 comprimés (12,5mg de ombitasvir + 75mg de paritaprevir + 50mg de ritonavir) 1 fois/jour		Au cours d'un repas. Doit obligatoirement être associé au Exviera® (G1) et/ou à la ribavirine (G1 et G4)



## INHIBITEUR NS5B

Tous géotypes	<b>SOF</b>	<b>SOVALDI®</b> (sofosbuvir) GILEAD		1 comprimé (400mg de sofosbuvir) 1 fois/jour		Au cours d'un repas. Doit obligatoirement être associé à un anti-VHC direct et/ou à la ribavirine et éventuellement à l'interféron pégylé.
Géotype 1	<b>DSV</b>	<b>EXVIERA®</b> (dasabuvir) ABBVIE		1 comprimé (250mg de dasabuvir) 2 fois/jour		Au cours d'un repas. Doit obligatoirement être associé au Viekirax et éventuellement à la ribavirine.

















## INHIBITEUR NS5A

Tous géotypes	<b>DCV</b>	<b>DAKLINZA®</b> (daclatasvir) BMS	 	1 comprimé (60mg de daclatasvir) 1 fois/jour 1 comprimé (30mg de daclatasvir) 1 fois/jour	 	Au cours ou en dehors d'un repas. Doit obligatoirement être associé à un anti VHC direct et/ou à la ribavirine.
---------------	------------	--	--	--	--	---

## INHIBITEUR DE PROTÉASE

Géotypes 1 et 4	<b>SMV</b>	<b>OLYSIO®</b> (simeprevir) JANSSEN		1 gélule (150mg de simeprevir) 1 fois/jour		Au cours d'un repas. Doit obligatoirement être associé à un anti VHC direct et/ou à la ribavirine.
-----------------	------------	---	---	--	---	--

## ANALOGUE NUCLÉOSIDIQUE

Tous géotypes	<b>RBV</b>	<b>COPEGUS®</b> (ribavirine) ROCHE	 	2 ou 3 comprimés (200mg de ribavirine) 2 fois/jour 1 comprimé (400mg de ribavirine) 2 fois/jour	 	Au cours d'un repas. Doit obligatoirement être associée à un anti-VHC direct et éventuellement à l'interféron pégylé.
Tous géotypes	<b>RBV</b>	<b>REBETOL®</b> (ribavirine) MSD		2 ou 3 gélules (200mg de ribavirine) 2 fois/jour		
Tous géotypes	<b>RBV</b>	<b>RIBAVIRINE</b> générique 200 mg BIOGARAN / MYLAN / SANDOZ	  	2 ou 3 comprimés ou gélules (200mg de ribavirine) 2 fois/jour	  	Les dosages 200 et 400mg peuvent être combinés pour atteindre 800 à 1200mg par jour répartis en 2 prises (400 ou 600mg matin et 400 ou 600mg soir).
Tous géotypes	<b>RBV</b>	<b>RIBAVIRINE</b> générique 400 mg BIOGARAN / MYLAN	 	1 comprimé (400mg de ribavirine) 2 fois/jour	 	



Toutes les infos sur vos traitements dans nos Infocartes



Disponible sur notre site, la brochure Mon premier traitement ARV



Vous prenez d'autres médicaments que les ARV ? Vérifiez leur compatibilité avec votre traitement grâce à notre Réglette

Ligne d'écoute : 01 43 67 00 00, du lundi au vendredi de 15h à 18h  
[www.actions-traitements.org](http://www.actions-traitements.org)

