

POURQUOI PRENDRE SOVALDI®-OLYSIO® ?



Votre traitement SOVALDI®-OLYSIO® combine deux molécules antivirales à action directe. SOVALDI® contient le sofosbuvir, et OLYSIO® contient le siméprévir, tous deux inhibiteurs du virus de l'hépatite C (VHC). Elles sont indiquées, toujours en association ou avec d'autres médicaments, et uniquement chez l'adulte (18 ans et plus) dans le traitement de l'hépatite C chronique.

Ce traitement a pour but de bloquer la multiplication du virus de l'hépatite C, et d'empêcher l'infection de nouvelles cellules, ce qui permet d'éliminer définitivement l'infection de l'organisme.

SOVALDI® et OLYSIO® prescrits conjointement peuvent être associés à la ribavirine,

Ce traitement est initié et surveillé par un médecin expérimenté dans la prise en charge des patients atteints d'hépatite C chronique.

Sa durée est fonction des médicaments co-administrés, de la nature des problèmes de foie et du génotype du virus VHC. Elle peut être de 12 à 24 semaines.

BIEN PRENDRE SOVALDI®-OLYSIO® ?



L'efficacité de votre traitement est maximale si vous respectez bien les horaires et les recommandations de prise de vos médicaments. Il est important de ne pas stopper votre traitement de votre propre initiative pour que les médicaments aient la meilleure chance de traiter votre infection par le virus de l'hépatite C.

Tout le monde peut rencontrer à certains moments des difficultés pour suivre son traitement correctement (« être observant »). Si cela devait être votre cas, parlez-en rapidement avec votre médecin, ou un autre professionnel de santé (pharmacien, infirmière).

Que faire si :

Vous avez pris plus que la dose prescrite : vous devez contacter immédiatement votre médecin ou le service des urgences le plus proche, pour conseil. Conservez le(s) flacon(s) de comprimés avec vous, pour pouvoir décrire facilement ce que vous avez pris.

Vous avez oublié de prendre votre comprimé :


- **de SOVALDI®** : si vous vous en rendez compte **dans les 18 heures** après l'heure de prise habituelle de ce médicament, vous devez prendre le comprimé le plus tôt possible **avec de la nourriture**. Prenez ensuite la dose suivante comme prévu ; si vous vous en rendez compte plus de 18 heures après l'heure de prise habituelle de ce médicament, attendez et prenez la dose suivante comme prévu. Ne prenez pas une double dose.

- **de OLYSIO®** : si vous vous en rendez compte **dans les 12 heures** après l'heure de prise habituelle de ce médicament, vous devez prendre une gélule le plus tôt possible **avec de la nourriture**. Prenez ensuite la dose suivante comme prévu ; si vous vous en rendez compte plus de 12 heures après l'heure de prise habituelle de ce médicament, attendez et prenez la dose suivante comme prévu. Ne prenez pas une double dose.

Vous avez vomi après avoir pris votre comprimé de SOVALDI® ou de

OLYSIO® : si cela fait moins de 2 heures après une prise de ce médicament, prenez un autre comprimé **avec de la nourriture**. Si vous vomissez plus de 2 heures après l'avoir pris, il est inutile de prendre un autre comprimé : attendez l'heure de la prochaine prise.

COMMENT PRENDRE SOVALDI®-OLYSIO® ?



Vous devez prendre :

- **SOVALDI®** à raison de 1 comprimé dosé à 400 mg 1 fois par jour, par voie orale, à la même heure tous les jours, **avec de la nourriture**.

- **OLYSIO®** à raison de 1 gélule dosée à 150 mg 1 fois par jour, par voie orale, à la même heure tous les jours, **avec de la nourriture**.

Les comprimés ne doivent pas être coupés, croqués ou écrasés. Ils ont un goût très amer.

Votre médecin vous dira combien de temps prendre ce traitement. Il n'est pas recommandé de réduire la dose par vous-même, ou d'arrêter le traitement, quelle qu'en soit la raison.

Si vous devez arrêter OLYSIO® pour des effets indésirables, il ne doit pas être réintroduit.

ATTENTION SOYEZ VIGILANT



SOVALDI® et OLYSIO® doivent être prescrits ensemble et parfois en association avec d'autres médicaments pour le traitement de l'infection à VHC. Consultez les notices des médicaments prescrits en association.

En cas d'arrêt définitif des médicaments utilisés en association, **le SOVALDI® comme le OLYSIO® ne doivent pas être pris en monothérapie**.

Informez immédiatement votre médecin si vous prenez un médicament pour le cœur et si vous présentez en cours de traitement : essoufflement, étourdissement, palpitations, évanouissement

Si vous avez des problèmes rénaux : SOVALDI® et OLYSIO® ne sont pas recommandés si vous souffrez d'une maladie rénale sévère. Avant de vous prescrire ce médicament, votre médecin évaluera votre fonction rénale (examens sanguins) et surveillera vos reins pendant le traitement.

Si vous devez vous déplacer dans une région de fort ensoleillement : des mesures de protection solaire doivent être prises et l'exposition évitée. En effet, OLYSIO® associé à d'autres médicaments induit des réactions de « photosensibilité » c'est-à-dire d'intolérance au soleil. Si cela est le cas, l'arrêt du traitement peut être envisagé et une surveillance doit être effectuée jusqu'à disparition des symptômes. De même, les cabines de bronzage sont contre-indiquées pendant le traitement.

Si vous présentez une éruption cutanée : signalez-le à votre médecin ou votre pharmacien. Ils vous conseilleront dans la surveillance d'une aggravation qui pourrait entraîner l'arrêt du traitement.

Si vous êtes en âge de procréer :

- Le traitement par SOVALDI® - OLYSIO® doit être évité pendant la grossesse et chez les femmes en âge de procréer. Vous devez en parler avec votre médecin et utiliser une méthode de contraception efficace.

- Lorsque la ribavirine est prescrite en association avec SOVALDI® - OLYSIO®, les femmes et les hommes en âge de procréer ou leur partenaire sexuel doivent utiliser une méthode de contraception efficace au cours du traitement et jusqu'à 7 mois après la fin du traitement, tel que recommandé dans la notice de la ribavirine (la consulter pour plus d'informations ou parlez-en avec votre médecin ou votre pharmacien).

- Aucune méthode contraceptive n'étant totalement fiable, il est impératif que les femmes en âge de procréer et leurs partenaires utilisent simultanément **deux** méthodes contraceptives efficaces pendant le traitement et dans les semaines qui suivent la fin du traitement.

N'allaitez pas pendant le traitement. Un risque pour les nourrissons ne peut être exclu. Par conséquent, cette association ne doit pas être utilisée pendant l'allaitement.

Si vous avez pris ou êtes amenés à prendre d'autres médicaments : informez-en toujours votre médecin ou votre pharmacien : OLYSIO® est susceptible d'interagir avec de nombreux autres médicaments. Votre médecin aura à adapter les doses ou à vous déconseiller la prise de certains médicaments.

Si vous devez conduire : fatigue, troubles de l'attention, vertiges et vision floue ont été rapportés. Ne conduisez qu'en l'absence de ces effets indésirables.

