

POURQUOI PRENDRE VIEKIRAX® - EXVIERA® ?



VIEKIRAX® est une association de 3 molécules (ombitasvir, paritaprévir et ritonavir). L'ombitasvir est un inhibiteur de polymérase actif sur le virus de l'hépatite C (VHC). Le paritaprévir est un inhibiteur de protéase, protéine qui est essentielle à la réplication virale. Le ritonavir est un « booster » du paritaprévir.

EXVIERA® est à base de dasabuvir. Comme l'ombitasvir, c'est un inhibiteur de polymérase actif sur le VHC.

VIEKIRAX® et EXVIERA® sont indiqués en association avec d'autres médicaments dans le traitement de l'hépatite C chronique chez les adultes.

Ils ont pour but de bloquer la multiplication du virus de l'hépatite C et d'empêcher l'infection de nouvelles cellules.

VIEKIRAX® est prescrit associé à EXVIERA® ou à la ribavirine, ou les 3 produits ensemble. Leur association permet d'éliminer la présence du virus dans votre organisme et d'arrêter la progression de la maladie hépatique.

L'ensemble du traitement est instauré et surveillé par un médecin expérimenté dans la prise en charge des patients atteints d'hépatite C chronique. Sa durée varie en fonction des médicaments co-administrés et du génotype du virus VHC. Elle peut être de 12 à 24 semaines.

BIEN PRENDRE VIEKIRAX® - EXVIERA® ?



L'efficacité de votre traitement est maximale si vous respectez bien les horaires et les recommandations de prise de vos médicaments. Il est important de ne pas stopper votre traitement de votre propre initiative pour que les médicaments aient la meilleure chance de traiter votre infection par le virus de l'hépatite C.

Tout le monde peut rencontrer à certains moments des difficultés pour suivre son traitement correctement (« être observant »). Si cela devait être votre cas, parlez-en rapidement avec votre médecin, ou un autre professionnel de santé (pharmacien, infirmière).

Que faire si :

Vous avez pris plus que la dose prescrite : vous devez contacter immédiatement votre médecin ou le service des urgences le plus proche, pour conseil. Conservez la boîte de comprimés avec vous, pour pouvoir décrire facilement ce que vous avez pris.

Vous avez oublié de prendre votre comprimé de VIEKIRAX® :

- si vous vous en rendez compte dans les 12 heures après l'heure de prise habituelle de ce médicament, vous devez prendre les 2 comprimés le plus tôt possible **avec de la nourriture**. Prenez ensuite la dose suivante comme prévu.

- si vous vous en rendez compte plus de 12 heures après l'heure de prise habituelle de ce médicament, attendez et prenez la dose suivante comme prévu. Ne prenez pas une double dose.

Vous avez oublié de prendre votre comprimé de EXVIERA® :

- si vous vous en rendez compte dans les 6 heures après l'heure de prise habituelle de ce médicament, vous devez prendre le comprimé le plus tôt possible **avec de la nourriture**. Prenez ensuite la dose suivante comme prévu.

- si vous vous en rendez compte plus de 6 heures après l'heure de prise habituelle de ce médicament, attendez et prenez la dose suivante comme prévu. Ne prenez pas une double dose.

COMMENT PRENDRE VIEKIRAX® - EXVIERA® ?



Exemple de prise sur une journée

Vous devez prendre 2 comprimés de VIEKIRAX® 1 fois par jour et 1 comprimé de EXVIERA® 2 fois par jour (matin et soir), soit par exemple :

Avec le petit déjeuner : 2 comprimés de VIEKIRAX® + 1 comprimé de EXVIERA®.

Avec le dîner : 1 comprimé de EXVIERA®

Ces médicaments se prennent **avec de la nourriture**. Votre médecin vous dira combien de temps prendre ces médicaments.

Ces comprimés ne doivent pas être coupés, croqués ou écrasés.

VIEKIRAX® et EXVIERA® doivent toujours être utilisés en association.

Il n'est pas recommandé de réduire leur dose, quelle qu'en soit la raison.

ATTENTION SOYEZ VIGILANT



VIEKIRAX® et EXVIERA® doivent être prescrits en association ensemble, ou avec de la ribavirine en plus.

VIEKIRAX® comme EXVIERA® ne doivent jamais être pris en monothérapie.

Si vous êtes en âge de procréer : votre médecin sera peut-être amené à revoir avec vous votre méthode de contraception pour éviter toute interaction avec votre traitement.

- **Lorsque ces traitements sont utilisés en association à la ribavirine,** les femmes en âge de procréer ou leurs partenaires masculins doivent utiliser une méthode de contraception efficace au cours du traitement et jusqu'à 7 mois après la fin du traitement, tel que recommandé dans la notice de la ribavirine (la consulter pour plus d'informations ou parlez-en avec votre médecin ou votre pharmacien).

- **Toutes les précautions doivent être prises afin d'éviter une grossesse chez les patientes et chez les partenaires féminines des patients prenant la ribavirine.** Aucune méthode contraceptive n'étant totalement fiable, il est impératif que les femmes en âge de procréer et leurs partenaires utilisent simultanément deux méthodes contraceptives efficaces pendant le traitement et dans les 7 mois qui suivent la fin du traitement.

N'allaitez pas pendant le traitement. Un risque pour les nourrissons ne peut être exclu. Par conséquent, VIEKIRAX® et EXVIERA® ne doivent pas être utilisés pendant l'allaitement.

Si vous devez conduire, des cas de fatigue ont été rapportés.

Ne conduisez qu'en l'absence de fatigue.

INTERACTIONS

Avec VIEKIRAX® - EXVIERA®, vous ne devez pas prendre :

- Antiasthmatiques :** Serevent® / Seretide® (salmétérol).
- Médicaments pour le cœur :** Cordarone® (amiodarone), Brilique® (ticagrélor).
- Médicaments contre le cholestérol :** Lodales® / Zocor® (simvastatine), Tahor® (atorvastatine), Lipur® (gemfibrozil), fluvastatine.
- Traitements de l'hypertrophie de la prostate :** Alfuzosine.
- Médicaments contre le VIH :** Atripla® / Sustiva® (éfavirenz), Viramune®, (névirapine), Intelence® (étravirine), Stribild® (cobicistat), Crixivan® (indinavir), Kaletra® (lopinavir), Invirase® (saquinavir), Aptivus® (tipranavir).
- Pilules contraceptives contenant de l'éthinylestradiol, c'est-à-dire la plupart des pilules contraceptives.**
- Antiépileptiques :** Tegretol® (carbamazépine), Dihydan® (phénytoïne), Gardenal®, Alespal® (phénobarbital), Trileptal® (oxcarbamazépine).
- Antimigraineux :** Gynergene® (ergotamine).
- Antibiotique :** Naxy® / Zeclar® / Monozeclar® (clarithromycine), Ketek® (télichromycine) ; Fucidine (acide fusidique).
- Antifongiques :** Sporanox® (itraconazole), VFend® (Voriconazole), Noxafil® (Posaconazole), Kétoconazole.
- Antipsychotiques :** Orap® (pimozide), Xeroquel® (quiétapine).
- Médicaments à base de plantes :** le Millepertuis sous toutes ses présentations dont Mildac®, Prosoft®.
- Antituberculeux :** Rifadine® (rifampicine).

Interactions avec d'autres médicaments :

Prendre des antiviraux n'est pas anodin, ils sont susceptibles d'interagir avec d'autres traitements. Demandez toujours l'avis de votre médecin avant de prendre un nouveau médicament, même acheté sans ordonnance. Prudence aussi avec les produits à base de plantes, certains aliments (jus de pamplemousse...), l'alcool et les drogues récréatives. Certains médicaments ou leurs génériques sont à prendre avec précaution, votre médecin adaptera les doses si nécessaire. Si vous prenez un des médicaments suivants, parlez-en à votre pharmacien ou à votre médecin :

- Antiasthmatiques :** Flixotide® / Flixovate® /Serevent® / Affera® / Flutiform® (fluticasone).
- Antiulcéreux :** oméprazole, ésomeprazole, lansoprazole.
- Médicament hypoglycémiant :** Répaglinide.
- Médicaments contre le cholestérol :** Crestor® (rosuvastatine), pravastatine.
- Antihypertenseur :** Valsartan.
- Médicaments pour le cœur et la circulation sanguine :** Digoxine® (digoxine), Amlor® (amlodipine), Adalate® (nifédipine), furosémide, Pradaxa® (dabigatran), verapamil, diltiazem.
- Sédatif / anxiolytique :** Alprazolam.
- Hormones thyroïdiennes :** Levothyrox®.
- Anti-inflammatoire intestinal :** Salazopyrine® (sulfasalazine).
- Antibiotique :** Ery® (érythromycine).

* Certains médicaments ne sont désignés que par leur Dénomination commune internationale (DCI), soit le nom de la molécule active, que vous retrouverez toujours sur la boîte de la spécialité délivrée (générique) ou sous son nom commercial.

EFFETS INDÉSIRABLES



Tous les médicaments sont susceptibles de provoquer des effets indésirables. Si vous ressentez un quelconque effet, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique évidemment à tout effet y compris parmi ceux indiqués ici.

Au cours du traitement par VIEKIRAX® associés à EXVIERA® et à la ribavirine, les effets indésirables les plus fréquemment rapportés sont ceux correspondants aux traitements par ribavirine.

Consultez les notices des médicaments prescrits en association.

Les effets indésirables les plus fréquents

- Troubles digestifs : nausées ;
- Troubles du système nerveux : insomnies ;
- Troubles généraux : fatigue ;
- Troubles cutanés : démangeaisons ;
- Des analyses sanguines peuvent montrer : une diminution du nombre des globules rouges (anémie).

Notes



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

« Un doute ? Vérifiez les interactions avec votre traitement ! »
www.actions-traitements.org/reglette

Commandez nos outils pratiques en ligne
www.actions-traitements.org/commande



Ligne d'écoute
01 43 67 00 00
 du lundi au vendredi de 15 h à 18 h



ACTIONS TRAITEMENTS
 23 rue Duris - 75020 PARIS
 Tél : 01 43 67 66 00 - Fax : 01 43 67 37 00
at@actions-traitements.org

[f /actiontraitements](https://www.facebook.com/actiontraitements) [@Association_AT](https://twitter.com/Association_AT)



infocarte 40
 Édition juin 2016

VIEKIRAX®



NS5A ombitasvir OBV

INP paritaprevir PTV

BOOSTER ritonavir RTV



EXVIERA®



NS5B dasabuvir DSV

