

POURQUOI PRENDRE VIEKIRAX® ?



VIEKIRAX® est une association de 3 molécules (ombitasvir, paritaprévir et ritonavir). L'ombitasvir est un inhibiteur de polymérase actif sur le virus de l'hépatite C (VHC). Le paritaprévir est un inhibiteur de protéase, protéine qui est essentielle à la réplication virale. Le ritonavir est un « booster » du paritaprévir. VIEKIRAX® est indiqué en association avec d'autres médicaments dans le traitement de l'hépatite C chronique chez les adultes.

Il a pour but de bloquer la multiplication du virus de l'hépatite C, et d'empêcher l'infection de nouvelles cellules.

VIEKIRAX® est prescrit associé à EXVIERA® (dasabuvir) ou à la ribavirine, ou les 3 produits ensemble. Leur association permet d'éliminer la présence du virus dans votre organisme et d'arrêter la progression de la maladie hépatique.

Ce traitement est instauré et surveillé par un médecin expérimenté dans la prise en charge des patients atteints d'hépatite C chronique. Sa durée est fonction des médicaments co-administrés et du génotype du virus VHC. Elle peut être de 12 à 24 semaines.

BIEN PRENDRE VIEKIRAX® ?



L'efficacité de votre traitement est maximale si vous respectez bien les horaires et les recommandations de prise de vos médicaments. Il est important de ne pas stopper votre traitement de votre propre initiative pour que les médicaments aient la meilleure chance de traiter votre infection par le virus de l'hépatite C.

Tout le monde peut rencontrer à certains moments des difficultés pour suivre son traitement correctement (« être observant »). Si cela devait être votre cas, parlez-en rapidement avec votre médecin, ou un autre professionnel de santé (pharmacien, infirmière).

Que faire si :

Vous avez pris plus que la dose prescrite : vous devez contacter immédiatement votre médecin ou le service des urgences le plus proche, pour conseil. Conservez la boîte de comprimés avec vous, pour pouvoir décrire facilement ce que vous avez pris.

Vous avez oublié de prendre votre comprimé de VIEKIRAX® :

- si vous vous en rendez compte dans les 12 heures après l'heure de prise habituelle de ce médicament, vous devez prendre les 2 comprimés le plus tôt possible, **avec de la nourriture**. Prenez ensuite la dose suivante comme prévu.

- si vous vous en rendez compte plus de 12 heures après l'heure de prise habituelle de ce médicament, attendez et prenez la dose suivante comme prévu. Ne prenez pas une double dose.

COMMENT PRENDRE VIEKIRAX® ?



Exemple de prise sur une journée

Vous devez prendre 2 comprimés 1 fois par jour, à la même heure tous les jours, **avec de la nourriture**. Votre médecin vous dira combien de temps prendre ce médicament.

Le comprimé ne doit pas être coupé, croqué ou écrasé.

VIEKIRAX® doit toujours être utilisé en association.

Il n'est pas recommandé de réduire la dose de VIEKIRAX®, quelle qu'en soit la raison.

ATTENTION SOYEZ VIGILANT



VIEKIRAX® doit être prescrit en association avec d'autres médicaments pour le traitement de l'infection à VHC. Consultez les notices des médicaments prescrits en association au VIEKIRAX®.

En cas d'arrêt définitif du traitement associé à VIEKIRAX®, c'est-à-dire EXVIERA® (dasabuvir) et/ou ribavirine, VIEKIRAX® doit également être arrêté.

Si vous êtes en âge de procréer : votre médecin sera peut-être amené à revoir avec vous votre méthode de contraception pour éviter toute interaction avec votre traitement.

- **Lorsque VIEKIRAX® est utilisé en association à la ribavirine,** les femmes en âge de procréer ou leurs partenaires masculins doivent utiliser une méthode de contraception efficace au cours du traitement et jusqu'à 7 mois après la fin du traitement, tel que recommandé dans la notice de la ribavirine (la consulter pour plus d'informations ou parlez-en avec votre médecin ou votre pharmacien).

- **Toutes les précautions doivent être prises afin d'éviter une grossesse** chez les patientes et chez les partenaires féminines des patients prenant la ribavirine. Aucune méthode contraceptive n'étant totalement fiable, il est impératif que les femmes en âge de procréer et leurs partenaires utilisent simultanément deux méthodes contraceptives efficaces pendant le traitement et dans les 7 mois qui suivent la fin du traitement.

N'allaites pas pendant le traitement. Un risque pour les nourrissons ne peut être exclu. Par conséquent, VIEKIRAX® ne doit pas être utilisé pendant l'allaitement.

Si vous devez conduire, des cas de fatigue ont été rapportés. Ne conduisez qu'en l'absence de fatigue.

