

POURQUOI PRENDRE ZEPATIER® ?



ZEPATIER® est une association de 2 molécules : grazoprevir, elbasvir, appelés « antiviraux à action directe ». Ce sont des inhibiteurs de protéases, protéines essentielles à la réplication virale, actifs sur le virus de l'hépatite C (VHC).

Il a pour but de bloquer la multiplication du virus de l'hépatite C, et d'empêcher l'infection de nouvelles cellules.

ZEPATIER® peut être prescrit seul ou associé à la ribavirine. Leur association permet d'éliminer la présence du virus dans votre organisme et d'arrêter la progression de la maladie hépatique.

Le traitement est instauré et surveillé par un médecin expérimenté dans la prise en charge des patients atteints d'hépatite C chronique. Sa durée varie en fonction de votre fonction hépatique, des médicaments co-administrés et du génotype du virus VHC.

Elle peut être de 12 à 16 semaines.

BIEN PRENDRE ZEPATIER® ?



L'efficacité de votre traitement est maximale si vous respectez bien les horaires et les recommandations de prise de vos médicaments. Il est important de ne pas stopper votre traitement de votre propre initiative pour que les médicaments aient la meilleure chance de traiter votre infection par le virus de l'hépatite C.

Tout le monde peut rencontrer à certains moments des difficultés pour suivre son traitement correctement (« être observant »). Si cela devait être votre cas, parlez-en rapidement avec votre médecin, ou un autre professionnel de santé (pharmacien, infirmière).

Que faire si :

Vous avez pris plus que la dose prescrite : vous devez contacter immédiatement votre médecin ou le service des urgences le plus proche, pour conseil. Conservez la boîte de comprimés avec vous, pour pouvoir décrire facilement ce que vous avez pris.

Vous avez oublié de prendre votre comprimé de ZEPATIER® :

- si vous vous en rendez compte dans les 16 heures après l'heure de prise habituelle de ce médicament, vous devez prendre le comprimé le plus tôt possible. Prenez ensuite la dose suivante comme prévu à l'horaire habituel.

- si vous vous en rendez compte plus de 16 heures après l'heure de prise habituelle de ce médicament, attendez et prenez la dose suivante comme prévu. Ne prenez pas une double dose.


Vous avez vomi après avoir pris votre comprimé de ZEPATIER® :

- si cela fait moins de 4 heures après l'administration, vous pouvez prendre à nouveau un comprimé jusqu'à 8 heures avant la dose suivante.

- si cela fait plus de 4 heures, vous n'avez pas besoin de prendre un autre comprimé. La prise suivante se fera à l'heure habituelle.

Pensez à en parler avec votre médecin ou votre pharmacien (à l'occasion du renouvellement de votre ordonnance)

COMMENT PRENDRE ZEPATIER® ?



Vous devez prendre :

- 1 comprimé de ZEPATIER® 1 fois par jour

Ce médicament se prend pendant ou en dehors des repas. Votre médecin vous dira combien de temps prendre votre traitement.

Les comprimés ne doivent pas être coupés, croqués ou écrasés.

Il n'est pas recommandé de réduire la dose, quelle qu'en soit la raison.

ATTENTION SOYEZ VIGILANT



Si vous êtes en âge de procréer : votre médecin sera peut-être amené à revoir avec vous votre méthode de contraception pour éviter toute interaction avec votre traitement.

- Lorsque ce traitement est prescrit en association à la ribavirine, les femmes en âge de procréer ou leurs partenaires masculins doivent utiliser une méthode de contraception efficace au cours du traitement et jusqu'à 7 mois après la fin du traitement, tel que recommandé dans la notice de la ribavirine (la consulter pour plus d'informations ou parlez-en avec votre médecin ou votre pharmacien).

- Toutes les précautions doivent être prises afin d'éviter une grossesse chez les patientes et chez les partenaires féminines des patients prenant la ribavirine. Aucune méthode contraceptive n'étant totalement fiable, il est impératif que les femmes en âge de procréer et leurs partenaires utilisent simultanément deux méthodes contraceptives efficaces pendant le traitement et dans les 7 mois qui suivent la fin du traitement.

N'allaitez pas pendant le traitement. Un risque pour les nourrissons ne peut être exclu. Par conséquent, ZEPATIER® ne doit pas être utilisé pendant l'allaitement.

Si vous souffrez d'une insuffisance hépatique modérée ou sévère : ce médicament vous est contre-indiqué. Une surveillance hépatique sera instaurée avant et pendant le traitement.

Si vous devez conduire, des cas de fatigue ont été rapportés. Ne conduisez qu'en l'absence de fatigue.

