

ABACAVIR-LAMIVUDINE Mylan

POURQUOI PRENDRE ABACAVIR-LAMIVUDINE ?



Votre traitement combine deux molécules antirétrovirales (ARV). Cette combinaison est l'association de deux molécules abacavir et lamivudine appelées analogues nucléosidiques de la transcriptase inverse. Cette combinaison, associée à une autre classe d'antirétroviraux (« trithérapie »), permet de stopper la multiplication du VIH. De plus, lamivudine est active sur le virus de l'hépatite B.

Ce traitement ne peut pas guérir l'infection à VIH mais il peut la contrôler. Il a pour but d'aider votre organisme, en bloquant la multiplication du virus (diminution de la charge virale), d'améliorer et de préserver vos défenses immunitaires (augmentation des CD4). Ainsi, le traitement ARV vous protège du risque d'apparition ou de rechute des maladies opportunistes.

Ce médicament antirétroviral vous est prescrit sous un nom appelé « Dénomination Commune Internationale » ou « DCI » qui est identique dans tous les pays au cas où vous voyagez. Il est aussi commercialisé sous le nom de KIVEXA® dont il est le médicament générique. Il ne doit en aucun cas lui être associé.

Votre traitement vous permet de maintenir une charge virale indétectable, mais le risque de transmission peut subsister dans certaines situations. Le préservatif reste un moyen efficace de prévenir la transmission du VIH et des autres infections sexuellement transmissibles.

BIEN PRENDRE ABACAVIR-LAMIVUDINE ?



L'efficacité de votre traitement est maximale si vous respectez bien les horaires et les recommandations de prise de vos médicaments. Il est important de ne pas stopper votre traitement de votre propre initiative. Une interruption, même sur une courte période, pourrait entraîner une augmentation de votre charge virale (**par reprise de la multiplication du VIH**). De plus, votre type de virus pourrait devenir résistant à votre traitement, c'est à dire insensible à l'effet de certains médicaments, ce qui pourrait le rendre plus difficile à traiter.

Tout le monde peut rencontrer à certains moments des difficultés pour suivre son traitement correctement (« être observant »). Si cela devait être votre cas, parlez-en rapidement avec votre médecin, un autre professionnel de santé (pharmacien, infirmière) ou bien encore avec une association de lutte contre le sida. Ils peuvent vous aider et vous orienter vers des consultations d'éducation thérapeutique. Ne laissez pas la situation se dégrader, réagissez. Il serait dommage qu'un traitement qui fonctionne perde de son efficacité.

Que faire si :

Vous avez pris plus que la dose prescrite : vous pouvez présenter un risque accru de développer des effets indésirables dus aux composants du médicament. Contactez immédiatement votre médecin, votre pharmacien ou bien le service d'urgence de l'hôpital le plus proche pour avis.

Vous avez oublié de prendre votre comprimé : prenez la dose oubliée dès que possible, puis poursuivez votre traitement normalement. Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oubliée de prendre. Parlez-en avec votre médecin ou votre pharmacien. Il est important que vous preniez régulièrement votre traitement, car une prise irrégulière est susceptible d'augmenter le risque de réaction d'hypersensibilité.

Vous avez vomi après avoir pris votre comprimé de abacavir-lamivudine Mylan : demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si vous devez reprendre 1 comprimé. Et parlez-en à votre médecin lors de la prochaine consultation ou à votre pharmacien lors du renouvellement de votre traitement.

Si vous arrêtez de prendre ce médicament : pour quelque raison que ce soit, tout particulièrement parce que vous pensez avoir des effets indésirables ou une autre maladie : consultez votre médecin avant de reprendre votre traitement.

Vous êtes co-infecté par le VIH et le virus de l'hépatite B (VHB) : il est indispensable que votre médecin en soit informé et tienne compte de l'action de la lamivudine sur le VHB (risque d'exacerbation sévère de l'hépatite B au cas où le traitement serait arrêté).

COMMENT PRENDRE ABACAVIR-LAMIVUDINE ?



Un comprimé une fois par jour, à la même heure, au cours ou en dehors des repas. Il est recommandé d'avaler le comprimé entier, avec de l'eau.

Si l'arrêt ou une modification de dose de l'un des composants de ce médicament est nécessaire, votre médecin pourra vous prescrire ces molécules sous leurs formes individuelles.

ATTENTION SOYEZ VIGILANT



Réactions allergiques : L'utilisation de l'abacavir contenu dans ce médicament peut entraîner l'apparition d'une réaction d'hypersensibilité (allergie) rare mais grave qui apparaît en général dans les 6 premières semaines du traitement. Cette réaction se manifeste par de la fièvre et/ou des réactions cutanées. Il peut aussi y avoir des manifestations respiratoires (difficultés à respirer, maux de gorge, toux), des troubles gastro-intestinaux tels que nausées, vomissements, diarrhée ou douleurs abdominales. Un malaise, des douleurs musculaires peuvent aussi apparaître. Si vous ressentez ces symptômes consultez rapidement votre médecin. Si vous avez déjà présenté une réaction de ce type avec de l'abacavir contenu dans une autre combinaison, ne reprenez pas ce traitement. Dans ce cas vous, devez rendre les comprimés restants à la pharmacie.

Une carte de mise sous traitement par abacavir-lamivudine Mylan est incluse dans la boîte. Il est important de conserver cette carte toujours sur vous.

Si vous avez des problèmes de foie, y compris une hépatite chronique active, parlez-en avec votre médecin. Les patients traités par des médicaments antirétroviraux tels que celui-ci présentent un risque plus élevé de problèmes hépatiques. Votre médecin surveillera votre foie pendant votre traitement par ces médicaments.

Si vous avez des problèmes rénaux : Ce médicament n'est pas recommandé si vous souffrez d'une maladie rénale modérée ou sévère. Avant de

vous le prescrire, votre médecin évaluera votre fonction rénale (examens sanguins) et surveillera vos reins pendant le traitement.

Si vous avez des problèmes cardiaques : la prise de abacavir-lamivudine peut favoriser des effets indésirables cardiaques. Parlez-en à votre médecin avant de prendre ce médicament.

Si vous êtes en âge de procréer ou avez un désir de grossesse, parlez-en à votre médecin. Le médecin et vous déciderez le meilleur traitement à prendre dans ce cas particulier.

N'allaitez pas pendant le traitement. Les substances actives de ces médicaments passent dans le lait maternel. D'une manière générale, il est recommandé aux femmes infectées par le VIH (même traitées) de ne pas allaiter.

Une surveillance du bilan lipidique et glycémique avant et sous traitement est recommandée : en effet, la prise de ce traitement peut entraîner une augmentation du taux de sucre et de graisses dans le sang (risque de diabète ou d'événements cardiovasculaires). Une alimentation équilibrée, l'arrêt du tabac et une activité physique régulière sont très importants pour réduire le risque de diabète, de maladies cardio-vasculaires et d'autres complications.

En cas de réaction allergique : Si vous avez arrêté le traitement avec abacavir-lamivudine à cause de la réaction allergique, **VOUS NE DEVEZ JAMAIS REPRENDRE CETTE ASSOCIATION** ni tout autre médicament contenant de l'abacavir ; cela peut entraîner dans les heures qui suivent, une chute de votre pression artérielle.

