

POURQUOI PRENDRE VOSEVI® ?



VOSEVI® est une association de 3 molécules : sofosbuvir, velpatasvir et voxilaprevir appelées "antiviraux à action directe".

Le sofosbuvir, est un inhibiteur de polymérase NS5B actif sur le virus de l'hépatite C (VHC), le velpatasvir un inhibiteur de NS5A, le voxilaprevir un inhibiteur de NS3/4A, protéines nécessaires à la réplication du virus de l'hépatite C. Ils agissent ensemble en bloquant ces trois protéines différentes dont le virus de l'hépatite C a besoin pour se développer et se reproduire, entraînant l'élimination de l'infection de l'organisme.

VOSEVI® est indiqué dans le traitement de l'hépatite C, quel que soit le génotype (variété) du virus, uniquement chez l'adulte.

Le traitement est instauré et surveillé par un médecin expérimenté dans la prise en charge des patients atteints d'hépatite C chronique. Sa durée varie en fonction de votre état de santé et de vos antécédents de traitements. Elle peut être de 8 semaines (en l'absence de traitements antérieurs) et jusqu'à 12 semaines.

BIEN PRENDRE VOSEVI® ?



L'efficacité de votre traitement est maximale si vous respectez bien les horaires et les recommandations de prise de vos médicaments. Il est important de ne pas stopper votre traitement de votre propre initiative pour que le traitement ait les meilleures chances de soigner votre infection par le virus de l'hépatite C.

Tout le monde peut rencontrer à certains moments des difficultés pour suivre son traitement correctement ("être observant"). Si cela devait être votre cas, parlez-en rapidement avec votre médecin ou à un autre professionnel de santé (pharmacien, infirmière).

Que faire si :

Vous avez pris plus que la dose prescrite : vous devez contacter immédiatement votre médecin ou le service des urgences le plus proche. Conservez la boîte de comprimés avec vous, pour pouvoir décrire facilement ce que vous avez pris.

Vous avez oublié de prendre votre comprimé de VOSEVI® :

- si vous vous en rendez compte **dans les 18 heures** après l'heure de prise habituelle de ce médicament, vous devez prendre le comprimé le plus tôt possible. Prenez ensuite la dose suivante comme prévu à l'horaire habituel ;
- si vous vous en rendez compte **plus de 18 heures** après l'heure de prise habituelle de ce médicament, attendez et prenez la dose suivante comme prévu. **Ne prenez pas une double dose.**

Vous avez vomi après avoir pris votre comprimé de VOSEVI® :

- si cela fait **moins de 4 heures** après l'administration, vous devez prendre à nouveau un comprimé ;
- si cela fait **plus de 4 heures**, vous n'avez pas besoin de prendre un autre comprimé. La prise suivante se fera à l'heure habituelle.

Pensez à en parler avec votre médecin ou votre pharmacien (à l'occasion du renouvellement de votre ordonnance).

COMMENT PRENDRE VOSEVI® ?



Vous devez prendre 1 comprimé 1 fois par jour de **VOSEVI®** avec de la nourriture.

Les comprimés ne doivent pas être coupés, croqués (goût amer) ou écrasés.

Il n'est pas recommandé de réduire la dose, quelle qu'en soit la raison. Votre médecin vous dira combien de temps prendre votre traitement.

ATTENTION SOYEZ VIGILANT



Si vous avez des problèmes rénaux : VOSEVI® n'est pas recommandé, en cas d'insuffisance rénale sévère. Avant de vous prescrire ce médicament, votre médecin évaluera votre fonction rénale (examens sanguins) et surveillera vos reins pendant le traitement.

Si vous avez des problèmes cardiaques tels que la bradycardie, parlez-en avec votre médecin, certains médicaments vous seront contre-indiqués. Si vous prenez un médicament pour le cœur tel que l'amiodarone (Cordarone®) et si vous présentez en cours de traitement : essoufflement, étourdissement, palpitations ou évanouissement, informez immédiatement votre médecin.

Si vous êtes co-infecté par le virus de l'hépatite B, une surveillance renforcée de l'infection sera nécessaire. Parlez-en avec votre médecin. Un dépistage du VHB sera effectué avant toute instauration de traitement.

Si vous êtes en âge de procréer : VOSEVI® n'est pas recommandé en cas de grossesse et est contre-indiqué lorsqu'il est associé à une contraception contenant de l'éthinylestradiol. Parlez-en avec votre médecin.

N'allaitez pas pendant le traitement. Un risque pour les nourrissons ne peut être exclu.

INTERACTIONS

Avec votre traitement, vous ne devez pas prendre* :

Médications à base de plantes : le millepertuis sous toutes ses présentations dont Prosoft®, Mildac®.

Contraceptifs contenant de l'éthinylestradiol : sous forme de comprimés ou d'anneaux vaginaux.

Antiépileptiques : Tegretol® (carbamazépine), Dihydan® (phénytoïne), Gardenal®, Alespal® (phénobarbital).

Anticoagulant : Pradaxa® (dabigatran).

Hypocholestérolémiant : Crestor® (rosuvastatine).

Médicaments de la tuberculose : Rifadine® (rifampicine), Ansatipine® (Rifabutine).

Interactions avec d'autres médicaments

Prendre des antiviraux à action directe n'est pas anodin, ils sont susceptibles d'interagir avec d'autres traitements. Demandez toujours l'avis de votre médecin ou pharmacien avant de prendre un nouveau médicament, même acheté sans ordonnance. Prudence aussi avec les produits à base de plantes, certains aliments (tels que le pamplemousse...), l'alcool et les drogues récréatives.

Certains médicaments sont à prendre avec précaution, votre médecin adaptera les doses si nécessaires. Si vous prenez un des médicaments suivants, parlez-en à votre pharmacien ou à votre médecin :

Traitement des brûlures gastriques : Gastropax®, Gastropulgit®, GeloX®, Maalox®, Marga®, Moxydar®, Pepciduo®, Topaal®, Xolaam® (hydroxyde d'aluminium et/ou de magnésium). Ces médicaments peuvent modifier l'absorption de VOSEVI® et doivent être pris 4 heures avant ou après.

Traitement des ulcères et des reflux gastriques : les "inhibiteurs de la pompe à protons" ou "IPP" tels que oméprazole, pantoprazole, lansoprazole, ésoméprazole, doivent être associés avec précaution et à doses réduites.

Cardiologie : Cordarone® (amiodarone), Hemigoxine® (digoxine). Une association avec VOSEVI® étant déconseillée, elle devra être soumise à une surveillance étroite.

Anticoagulants "antivitamines K" : Previscan®, Sintrom®, Coumadine® : une surveillance de l'INR plus étroite sera effectuée.

Hypocholestérolémiant : Un traitement avec simvastatine, atorvastatine, lovastatine n'est pas recommandé.

Antiépileptiques : Trileptal® (oxcarbamazépine).

Antirétroviraux du VIH : les spécialités contenant du ténofovir, efavirenz, atazanavir.

Immunosuppresseurs : ciclosporine.

*Certains médicaments ne sont désignés que par leur DCI (dénomination commune internationale), soit le nom de la molécule active, que vous retrouverez toujours sur la boîte de la spécialité délivrée (générique) ou sous son nom commercial.

EFFETS INDÉSIRABLES



Tous les médicaments sont susceptibles de provoquer des effets indésirables. Si vous ressentez un quelconque effet, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ce médicament fait l'objet d'une surveillance supplémentaire qui permettra l'identification rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité. Vous pouvez y contribuer en signalant tout effet indésirable que vous observez.

Consultez rapidement votre médecin si vous présentez un des symptômes suivants : essoufflement, étourdissement, palpitations, évanouissement. Cela peut correspondre à un trouble du rythme cardiaque (bradycardie) sévère.

Les effets indésirables les plus fréquents

D'autres effets indésirables peuvent survenir et la plupart sont temporaires (2 à 6 semaines). Si vous ressentez l'un de ces effets (liste non exhaustive) et que vous êtes trop incommodé, parlez-en avec votre médecin.

Troubles du système nerveux : maux de tête, fatigue.

Troubles digestifs : nausées, diarrhées, vomissements, douleurs abdominales, perte de l'appétit.

Troubles musculaires : myalgies (douleurs musculaires).

Des analyses sanguines peuvent également montrer une augmentation de la bilirubine totale (trouble de la fonction hépatique).

Notes



.....
.....
.....
.....
.....

"Un doute ? Vérifiez les interactions avec votre traitement !"

www.actions-traitements.org/reglette

Commandez nos outils pratiques en ligne

www.actions-traitements.org/commande



Ligne d'écoute

01 43 67 00 00

le lundi et le jeudi de 15 h à 18 h



at
actions traitements
ASSOCIATION DE PATIENTS AGRÉÉE

ACTIONS TRAITEMENTS

23 rue Duris - 75020 PARIS
Tél : 01 43 67 66 00

at@actions-traitements.org

[f /actionstraitements](https://www.facebook.com/actionstraitements) [@Association_AT](https://twitter.com/Association_AT)

Ce document est rédigé et édité sous la responsabilité d'Actions Traitements, association de patients. Il n'est pas exhaustif : n'hésitez pas à contacter votre médecin ou pharmacien en cas de doute. La thérapeutique change rapidement, imposant des mises à jour régulières. Tenez-vous informé, parlez-en avec votre médecin.



infocarte 48

Édition janvier 2018

VOSEVI®



NS5B

sofosbuvir

SOF

NS5A

velpatasvir

VEL

NS3/4A

voxilaprevir

VOX

at
actions traitements
ASSOCIATION DE PATIENTS AGRÉÉE