



POURQUOI PRENDRE REKAMBYS® ?

Rekambys® est une spécialité antirétrovirale (ARV) injectable composée de rilpivirine (inhibiteur non nucléosidique de la transcriptase inverse). Ce traitement est indiqué, en association avec le cabotégravir injectable, pour le traitement de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine de type 1 (VIH-1) chez le patient adulte dont la charge virale est indétectable, sous traitement ARV stable, sans preuve de résistance et sans antécédents d'échec virologique aux inhibiteurs non nucléosidiques de la transcriptase inverse et aux inhibiteurs d'intégrase.

Ce traitement ne peut pas guérir l'infection à VIH mais il peut la contrôler. Il a pour objectif d'atteindre une charge virale indétectable en bloquant la multiplication du virus (diminution de la charge virale) et en améliorant et préservant vos défenses immunitaires (augmentation des CD4). Ainsi, bien que vous soyez toujours porteur du VIH, vous ne pouvez plus le transmettre par voie sexuelle. C'est ce que l'on appelle le TASP (Treatment as prevention : le traitement comme prévention).

Le traitement vous protège aussi du risque d'apparition ou de rechute des maladies opportunistes. Ce sont des maladies qui s'installent quand les défenses immunitaires (CD4) sont faibles et la charge virale élevée.



BIEN PRENDRE REKAMBYS® ?

L'efficacité de votre traitement est garantie uniquement si vous respectez le schéma d'administration de vos injections. Il est important de ne pas stopper votre traitement de votre propre initiative. Une interruption pourrait entraîner une augmentation de votre charge virale. De plus, le virus pourrait devenir résistant au traitement le rendant ainsi plus difficile à traiter.

Tout le monde peut rencontrer à certains moments des difficultés pour suivre son traitement correctement (« être observant »). Si cela devait être votre cas, parlez-en rapidement avec votre médecin, un autre professionnel de santé (pharmacien, infirmier) ou bien encore avec une association de lutte contre le VIH/sida. Ils peuvent vous aider et vous orienter vers des consultations d'éducation thérapeutique.

Que faire si :

Vous avez oublié ou ne pouvez pas être présent au rendez-vous pour votre injection de Rekambys®.

- **une réévaluation clinique** est nécessaire afin de s'assurer que la reprise du traitement est appropriée.

- **en cas d'oubli du rendez-vous après la période d'instauration orale**, parlez-en à votre médecin qui vous donnera la procédure à suivre.

- **en cas d'impossibilité pour votre rendez-vous mensuel ou bimensuel**, il est possible de recevoir l'injection 7 jours avant ou 7 jours après la date d'administration prévue. Sinon, un traitement par voie orale sera envisagé jusqu'à la date de l'injection suivante.

COMMENT PRENDRE REKAMBYS® ?

Rekambys® est un médicament injectable et doit être administré par voie intramusculaire par un professionnel de santé selon la fréquence définie au préalable par le médecin. Il est toujours administré en même temps que le cabotégravir injectable (Vocabria®). Ces deux injections se font en deux sites d'injection distincts du muscle fessier. L'ordre des injections est sans importance.

Avant tout traitement par Rekambys®, la rilpivirine et le cabotégravir doivent être pris **sous forme de comprimé une fois par jour au cours d'un repas pendant au moins 28 jours** pour évaluer la tolérance. Si vous répondez bien à ce traitement, l'administration de Rekambys® sera possible dès le dernier jour de l'administration orale.

Si l'arrêt de Rekambys® est envisagé, un autre traitement ARV sera instauré au plus tard un ou deux mois après la dernière injection de Rekambys® selon la situation.

ATTENTION SOYEZ VIGILANT



Rekambys® est un traitement contre le VIH-1, il ne doit pas être pris avec tout autre médicament contenant les mêmes molécules.

Si vous êtes en âge de procréer : si vous avez un désir de grossesse, parlez-en avec votre médecin qui adaptera votre traitement et votre suivi.

N'allaitez pas pendant le traitement. Le passage de Rekambys® dans le lait maternel est possible. Par ailleurs, il est recommandé aux femmes infectées par le VIH de ne pas allaiter. Un risque pour les nourrissons ne peut être exclu.

Si vous devez conduire ou utiliser des machines : des sensations vertigineuses, de la fatigue ou des somnolences peuvent altérer vos capacités.



INTERACTIONS

Avec ce traitement, vous ne devez pas prendre * :

Anticonvulsivants : carbamazépine, oxcarbazépine, phénobarbital, phénytoïne.

Anti-infectieux : rifabutine, rifampicine, rifapentine.

Corticostéroïdes systémiques : dexaméthasone (sauf en prise unique).

Médications à base de plantes : millepertuis.

Interactions avec d'autres médicaments

Prendre des antirétroviraux n'est pas anodin, ils sont susceptibles d'interagir avec d'autres traitements. Demandez toujours l'avis de votre médecin ou pharmacien avant de prendre un nouveau médicament, même acheté sans ordonnance, **et consultez la notice**. Prudence aussi avec les produits à base de plantes, l'alcool et les drogues récréatives. **Pour vérifier une interaction vous pouvez aussi consulter notre réglette d'interactions**.**

Certains médicaments sont à prendre avec précaution, votre médecin adaptera les doses si nécessaires.

Interactions avec d'autres médicaments

Analgésiques opioïdes : méthadone (en traitement d'entretien).

Anti-infectieux : clarithromycine, érythromycine.

* Certains médicaments sont désignés par leur DCI (Dénomination Commune Internationale), nom de la molécule active, que vous retrouverez toujours sur la boîte de la spécialité délivrée (générique) ou sous son nom commercial.

** Notre réglette d'interaction est disponible en version papier gratuitement sur notre site internet mais aussi en version numérique sur notre site internet ou en téléchargement gratuit sur Smartphone Apple et Android sous le nom AT MedInfo.



EFFETS INDÉSIRABLES

Même si les effets indésirables ne sont pas systématiques, tous les médicaments sont susceptibles d'en provoquer. Si vous ressentez un quelconque effet, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique évidemment à tout effet y compris parmi ceux indiqués ici.

Consultez rapidement votre médecin si vous présentez un des symptômes suivants : douleurs articulaires (surtout au niveau des hanches, des genoux et des épaules), raideurs, problèmes osseux, signes d'inflammation ou d'infection.

Les effets indésirables fréquents et très fréquents

Ils sont bénins et la plupart sont temporaires. Si vous ressentez l'un de ces effets (liste non exhaustive) et que vous êtes trop incommodé, parlez-en avec votre médecin.

Affections cutanées : éruption cutanée.

Affections du système nerveux : céphalées, sensations vertigineuses.

Affections gastro-intestinales : diarrhées, douleurs abdominales, flatulences, gêne abdominale, nausées, sécheresse buccale, vomissements.

Affections hématologiques : diminution du taux des globules blancs, diminution de l'hémoglobine, diminution du taux de plaquettes.

Affections musculosquelettiques : douleurs musculaires.

Affections psychiatriques : anxiété, dépression, humeur dépressive, insomnie, rêves anormaux, troubles du sommeil.

Troubles du métabolisme : augmentation des triglycérides et du cholestérol, diminution de l'appétit, prise de poids.

Troubles généraux : fatigue, fièvre, malaise, réaction au site d'injection (jusqu'à 3 jours après l'injection).

• « Un doute ? Vérifiez les interactions avec votre traitement ! »

www.actions-traitements.org/reglette

• Ligne d'écoute

01 43 67 00 00

lundi au jeudi de 15h à 18h

• ou par mail 7j/7 :

ecoute@actions-traitements.org

• Commandez nos outils pratiques en ligne

www.actions-traitements.org/commande

Évaluer nos outils



infocarte 61

Version 2021

REKAMBYS®



INNTI

Rilpivirine

RPV



ACTIONS TRAITEMENTS

23 rue Duris - 75020 PARIS

Tél : 01 43 67 66 00

at@actions-traitements.org

[/actionstraitements](https://www.facebook.com/actionstraitements) [@Association_AT](https://twitter.com/Association_AT)

[@actionstraitements](https://www.instagram.com/actionstraitements) [Actions Traitements](https://www.youtube.com/channel/UC...)

Ce document est rédigé et édité sous la responsabilité d'Actions Traitements, association de patients. Il n'est pas exhaustif : n'hésitez pas à contacter votre médecin ou pharmacien en cas de doute. La thérapeutique change rapidement, imposant des mises à jour régulières. Tenez-vous informé, parlez-en avec votre médecin.

