



## POURQUOI PRENDRE VOCABRIA® ?

Vocabria® est une spécialité antirétrovirale (ARV) injectable composée de cabotegravir (inhibiteur d'intégrase). Ce traitement est indiqué, en association avec la rilpivirine injectable, pour le traitement de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine de type 1 (VIH-1) chez le patient adulte dont la charge virale est indétectable, sous traitement ARV stable, sans preuve de résistance actuelle ou antérieure et sans antécédent d'échec virologique aux inhibiteurs non nucléosidiques de la transcriptase inverse et aux inhibiteurs d'intégrase.

Ce traitement ne peut pas guérir l'infection à VIH mais il peut la contrôler. Il a pour objectif d'atteindre une charge virale indétectable en bloquant la multiplication du virus (diminution de la charge virale) et en améliorant et préservant vos défenses immunitaires (augmentation des CD4). Ainsi, bien que vous soyez toujours porteur du VIH, vous ne pouvez plus le transmettre par voie sexuelle. C'est ce que l'on appelle le TASP (Treatment as prevention : le traitement comme prévention).

Le traitement ARV vous protège aussi du risque d'apparition ou de rechute des maladies opportunistes. Ce sont des maladies qui s'installent quand les défenses immunitaires (CD4) sont faibles et la charge virale élevée.



## BIEN PRENDRE VOCABRIA® ?

L'efficacité de votre traitement est garantie si vous respectez le schéma d'administration de vos injections. Il est important de ne pas stopper le traitement sans concertation avec les soignants. Une interruption non programmée pourrait entraîner une augmentation de votre charge virale et une résistance du virus qui pourrait devenir résistant au traitement le rendant ainsi plus difficile à traiter.

Tout le monde peut rencontrer à certains moments des difficultés pour suivre son traitement correctement (« être observant »). Si cela devait être votre cas, parlez-en rapidement avec votre médecin, un autre professionnel de santé (pharmacien, infirmier) ou bien encore avec une association de lutte contre le VIH/sida. Ils peuvent vous aider et vous orienter vers des consultations d'éducation thérapeutique.

### Que faire si :

**Vous avez oublié ou ne pouvez pas être présent au rendez-vous pour votre injection de Vocabria® :**

- **une réévaluation clinique** est nécessaire afin de s'assurer que la reprise du traitement est appropriée.

- **en cas d'oubli du rendez-vous après la période d'instauration orale**, parlez-en à votre médecin qui vous donnera la procédure à suivre.

- **en cas d'impossibilité pour un rendez-vous mensuel ou bimensuel**, il est possible de recevoir l'injection 7 jours avant ou 7 jours après la date d'administration prévue. Sinon, un traitement par voie orale sera envisagé jusqu'à la date de l'injection suivante.

## COMMENT PRENDRE VOCABRIA® ?

Vocabria® est un médicament injectable et doit être administré par voie intramusculaire par un professionnel de santé selon la fréquence définie au préalable par le médecin. Il est toujours administré en même temps que la rilpivirine injectable (Rekambys®). Ces deux injections se font en deux sites d'injection distincts du muscle fessier. L'ordre des injections est sans importance. Avant tout traitement par Vocabria®, la rilpivirine et le cabotegravir doivent être pris **sous forme de comprimé une fois par jour au cours d'un repas pendant au moins 28 jours** pour en évaluer la tolérance. Si vous répondez bien à ce traitement, l'administration de Vocabria® sera possible au dernier jour du traitement oral.

Si l'arrêt de Vocabria® est envisagé, un autre traitement ARV sera instauré au plus tard un ou deux mois après la dernière injection de Vocabria® selon la situation.

## ATTENTION SOYEZ VIGILANT



**Vocabria® est un traitement contre le VIH-1, il ne doit pas être pris avec tout autre médicament contenant les mêmes molécules.**

**Si vous êtes en âge de procréer** : si vous avez un désir de grossesse, parlez-en avec votre médecin qui adaptera votre traitement et votre suivi.

**N'allaitez pas pendant le traitement.** Le passage de Vocabria® dans le lait maternel est possible. Il est recommandé aux femmes infectées par le VIH de ne pas allaiter. Un risque pour les nourrissons ne peut être exclu.

**Si vous devez conduire ou utiliser des machines** : des sensations vertigineuses, de la fatigue ou des somnolences peuvent altérer vos capacités.



## INTERACTIONS

**Avec ce traitement, vous ne devez pas prendre \* :**

**Anticonvulsivants :** carbamazépine, oxcarbazépine, phénobarbital, phénytoïne.

**Anti-infectieux :** rifampicine, rifapentine.

**Corticoïdes systémiques :** dexaméthasone (sauf en prise unique).

**Inhibiteurs de la pompe à protons :** oméprazole, ésoméprazole, lansoprazole, pantoprazole, rabéprazole.

**Médications à base de plantes :** millepertuis.

### Interactions avec d'autres médicaments

Prendre des antirétroviraux n'est pas anodin, ils sont susceptibles d'interagir avec d'autres traitements ou des remèdes de phytothérapies. Demandez toujours l'avis de votre médecin ou pharmacien avant de prendre un nouveau médicament, même acheté sans ordonnance, **et consultez la notice**. Prudence aussi avec les produits à base de plantes, l'alcool et les drogues récréatives.

**Pour vérifier une interaction vous pouvez aussi consulter notre réglette d'interactions\*\*.**

Certains médicaments sont à prendre avec précaution, votre médecin adaptera les doses si nécessaire.

### Interactions avec d'autres médicaments

**Anti-infectieux :** rifabutine.



## EFFETS INDÉSIRABLES

Même si les effets indésirables ne sont pas systématiques, tous les médicaments sont susceptibles d'en provoquer. Si vous ressentez un quelconque effet, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique évidemment à tout effet y compris parmi ceux indiqués ici.

**Consultez rapidement votre médecin si vous présentez un des symptômes suivants :** douleurs articulaires (surtout au niveau des hanches, des genoux et des épaules), raideurs, problèmes osseux, signes d'inflammation ou d'infection.

### Les effets indésirables fréquents et très fréquents (liste non exhaustive)

Ils sont bénins et la plupart sont temporaires. Si vous ressentez l'un de ces effets (liste non exhaustive) et que vous êtes trop incommodé, parlez-en avec votre médecin.

**Affections cutanées :** éruption cutanée.

**Affections du système nerveux :** céphalées, sensations vertigineuses.

**Affections gastro-intestinales :** diarrhées, douleurs abdominales, flatulences, nausées, vomissements.

**Affections musculosquelettiques :** douleurs musculaires.

**Affections psychiatriques :** anxiété, dépression, insomnie, rêves anormaux.

**Troubles du métabolisme :** prise de poids.

**Troubles généraux :** fatigue, fièvre, malaise, réaction au site d'injection (jusqu'à 3 jours après l'injection).

\* Certains médicaments sont désignés par leur DCI (Dénomination Commune Internationale), nom de la molécule active, que vous retrouverez toujours sur la boîte de la spécialité délivrée (générique) ou sous son nom commercial.

\*\* Notre réglette d'interaction est disponible en version papier gratuitement sur notre site internet mais aussi en version numérique sur notre site internet ou en téléchargement gratuit sur Smartphone Apple et Android sous le nom AT MedInfo.

• « Un doute ? Vérifiez les interactions avec votre traitement ! »

[www.actions-traitements.org/reglette](http://www.actions-traitements.org/reglette)

• Ligne d'écoute

01 43 67 00 00

lundi au jeudi de 15h à 18h

• ou par mail 7j/7 :

[ecoute@actions-traitements.org](mailto:ecoute@actions-traitements.org)

• Commandez nos outils pratiques en ligne

[www.actions-traitements.org/commande](http://www.actions-traitements.org/commande)

Évaluer nos outils



# infocarte 60

Version 2021

## VOCABRIA®



INHIBITEUR DE  
L'INTÉGRASE

Cabotegravir

CBG



**ACTIONS TRAITEMENTS**

23 rue Duris - 75020 PARIS

Tél : 01 43 67 66 00

[at@actions-traitements.org](mailto:at@actions-traitements.org)

[/actionstraitements](https://www.facebook.com/actionstraitements) [@Association\\_AT](https://twitter.com/Association_AT)

[@actionstraitements](https://www.instagram.com/actionstraitements) [Actions Traitements](https://www.youtube.com/channel/UC...)

Ce document est rédigé et édité sous la responsabilité d'Actions Traitements, association de patients. Il n'est pas exhaustif : n'hésitez pas à contacter votre médecin ou pharmacien en cas de doute. La thérapeutique change rapidement, imposant des mises à jour régulières. Tenez-vous informé, parlez-en avec votre médecin.

