Seules les posologies adultes les plus courantes sont présentées dans ce tableau

Médicaments antirétroviraux

ASSOCIATIONS DE PLUSIEURS MOLÉCULES

	COMBINAISONS DE 4 MOLÉCULES	DOSAGE ET POSOLOGIE ADULTE	PLANIFICATION DES PRISES	RECOMMANDATION DE PRISE **
TAF+FTC+ EVG+COBI	**TÉNOFOVIR ALAFENAMIDE + EMTRICITABINE + ELVITÉGRAVIR + COBICISTAT**			
	GENVOYA® GILEAD	1 comprimé (10 mg ténofovir alafénamide + 200 mg emtricitabine + 150 mg elvitégravir + 150 mg cobicistat) 1 fois/jour	toutes les 24h	à prendre au cours d'un repas (400 Kcal)
	COMBINAISONS DE 3 MOLÉCULES			
EFV+FTC+TDF	**EFAVIRENZ + EMTRICITABINE + TÉNOFOVIR DISOPROXIL**			
	ATRIPLA® GILEAD	1 comprimé (600 mg efavirenz + 200 mg emtricitabine + 245 mg ténofovir disoproxil) 1 fois/jour	toutes les 24h	à prendre à jeun (1h avant ou 2h après un repas), de préférence le soir au coucher
	Génériques de Atripla® GILEAD	BIOGARAN, KRKA, MYLAN, SANDOZ, TEVA	ZENTIVA	
BIC+FTC +TAF	**BICTÉGRAVIR + EMTRICITABINE + TÉNOFOVIR ALAFÉNAMIDE**			
	BIKTARVY® GILEAD	1 comprimé (50 mg bictégravir + 200 mg emtricitabine + 25 mg ténofovir alafénamide) 1 fois/jour	toutes les 24h	à prendre au cours ou en dehors d'un repas
DOR+3TC +TDF	**TÉNOFOVIR DISOPROXIL + DORAVIRINE + LAMIVUDINE**			
	DELSTRIGO® MSD	1 comprimé (245 mg ténofovir disoproxil + 100 mg doravirine + 245 mg lamivudine) 1 fois/jour	toutes les 24h	à prendre au cours ou en dehors d'un repas
RPV+FTC +TDF	**RILPIVIRINE + EMTRICITABINE + TÉNOFOVIR DISOPROXIL**			
	EVIPLERA® GILEAD	1 comprimé (25 mg rilpivirine + 200 mg emtricitabine + 245 mg ténofovir disoproxil) 1 fois/jour	toutes les 24h	à prendre au cours d'un repas
RPV+FTC +TAF	**RILPIVIRINE + EMTRICITABINE + TÉNOFOVIR ALAFÉNAMIDE**			
	ODEFSEY® GILEAD	1 comprimé (25 mg rilpivirine + 200 mg emtricitabine + 25 mg ténofovir alafénamide) 1 fois/jour	toutes les 24h	à prendre au cours d'un repas
3TC + ABC+DTG	**ABACAVIR + LAMIVUDINE + DOLUTÉGRAVIR**			
	TRIUMEQ® VIIV HEALTHCARE	1 comprimé (600 mg abacavir + 300 mg lamivudine + 50 mg dolutégravir) 1 fois/jour	toutes les 24h	à prendre au cours ou en dehors d'un repas
	COMBINAISONS DE 2 MOLÉCULES			
3TC + ZDV	**LAMIVUDINE + ZIDOVUDINE**			
	COMBIVIR® VIIV HEALTHCARE	1 comprimé (150 mg lamivudine + 300 mg zidovudine) 2 fois/jour	toutes les 12h	à prendre au cours ou en dehors d'un repas
	Génériques de Combivir® VIIV HEALTHCARE	ARROW, MYLAN, SANDOZ, TEVA		
CBG + RPV	**CABOTÉGRAVIR + RILPIVIRINE**			
	VOCABRIA® VIIV HEALTHCARE + REKAMBYS® JANSSEN	Instauration orale optionnelle : 1 comprimé de cabotégravir (30 mg) en association avec, 1 comprimé de rilpivirine (25 mg), 1 fois/jour pendant 1 mois.	toutes les 24h	à prendre au cours d'un repas
		Injections d'initiation aux mois 1 et 2 : une injection de 600 mg (3mL) de cabotégravir en association avec une injection de 900 mg (3mL) de rilpivirine.		bien suivre les recommandations
		A partir du mois 4, injection tous les 2 mois : une injection de 600 mg (3mL) de cabotégravir en association avec une injection de 900 mg (3mL) de rilpivirine.		
DTG+3TC	**DOLUTÉGRAVIR + LAMIVUDINE**			
	DOVATO® VIIV HEALTHCARE	1 comprimé (50 mg dolutégravir + 300 mg lamivudine) 1 fois/jour	toutes les 24h	à prendre au cours ou en dehors d'un repas
DTG+RPV	**DOLUTÉGRAVIR + RILPIVIRINE**			
	JULUCA® VIIV HEALTHCARE	1 comprimé (50 mg dolutégravir + 25 mg rilpivirine) 1 fois/jour	toutes les 24h	à prendre au cours d'un repas
ABC+3TC	**ABACAVIR + LAMIVUDINE**			
	KIVEXA® VIIV HEALTHCARE	1 comprimé (600 mg abacavir + 300 mg lamivudine) 1 fois/jour	toutes les 24h	à prendre au cours ou en dehors d'un repas
	Génériques de kivexa® VIIV HEALTHCARE	BIOGARAN, MYLAN, SANDOZ, TEVA	ZENTIVA	
FTC+TDF	**EMTRICITABINE + TÉNOFOVIR DISOPROXIL**			
	TRUVADA® GILEAD	1 comprimé (200 mg emtricitabine + 245 mg ténofovir disoproxil) 1 fois/jour	toutes les 24h	à prendre de préférence avec un repas
	Génériques de Truvada® GILEAD	BIOGARAN, KRKA, MYLAN, SANDOZ, TEVA	ZENTIVA	

INHIBITEURS NUCLÉOSIDIQUES DE LA TRANSCRIPTASE INVERSE (INTI)

FTC	**EMTRICITABINE**			
	EMTRIVA® GILEAD	1 gélule (200 mg), 1 fois/jour	toutes les 24h	à prendre au cours ou en dehors d'un repas
3TC	**LAMIVUDINE**			
	EPIVIR® VIIV HEALTHCARE	1 comprimé (150 mg), 2 fois/jour	toutes les 12h	à prendre au cours ou en dehors d'un repas
		ou 1 comprimé (300 mg), 1 fois/jour	toutes les 24h	
	Génériques de Epivir® VIIV HEALTHCARE	MYLAN 150 mg / MYLAN 300 mg		
TDF	**TÉNOFOVIR DISOPROXIL**			
	VIREAD® GILEAD	1 comprimé (245 mg), 1 fois/jour	toutes les 24h	à prendre au cours d'un repas
	Génériques de Viread® GILEAD	ARROW, BIOGARAN, MYLAN, SANDOZ, TEVA	ZENTIVA	à prendre au cours d'un repas

INHIBITEURS DE LA PROTÉASE (IP)

DRV	**DARUNAVIR**			
	PREZISTA® JANSSEN	2 comprimés (400 mg), 1 fois/jour boostés avec 100 mg de Norvir®	toutes les 24h	à prendre au cours d'un repas
		ou 1 comprimé (600 mg), 2 fois/jour boosté avec 100 mg de Norvir® à chaque prise	toutes les 12h	
	Génériques de Prezista® BOEHRINGER INGELHEIM	ou 1 comprimé (800 mg), 1 fois/jour boosté avec 100 mg de Norvir®	toutes les 24h	
		KRKA 600 MG, KRKA 800 MG, MYLAN 400 MG, MYLAN 600 MG, MYLAN 800 MG		
ATV	**ATAZANAVIR**			
	REYATAZ® BMS	1 gélule (300 mg), 1 fois/jour boostée avec 100 mg de Norvir ® (ou 2 gélules à 200 mg en fonction du traitement antirétroviral associé)	toutes les 24h	à prendre au cours d'un repas

INHIBITEUR DE POST-ATTACHEMENT

IBA	**IBALIZUMAB**			
	TROGARZO® THERATECHNOLOGIES *Traitement bénéficiant d'une Autorisation Temporaire d'Utilisation (ATU).*	1 dose de charge unique 2000 mg (en perfusion)		bien suivre les recommandations
		1 dose d'entretien 800 mg toutes les 2 semaines (en perfusion)		

Des conseils et astuces pour bien prendre son traitement sont disponibles sur l'affiche grand format.

INHIBITEURS NON NUCLÉOSIDIQUES DE LA TRANSCRIPTASE INVERSE (INNTI)

		DOSAGE ET POSOLOGIE ADULTE	PLANIFICATION DES PRISES	RECOMMANDATION DE PRISE **
	RILPIVIRINE			
RPV	EDURANT® JANSSEN	1 comprimé (25 mg), 1 fois/jour	toutes les 24h	à prendre au cours d'un repas (min. 500 Kcal)
	ETRAVIRINE			
EVR	INTELENCE® JANSSEN	2 comprimés (100 mg), 2 fois/jour	toutes les 12h	à prendre au cours d'un repas
		ou 1 comprimé (200 mg), 2 fois/jour	toutes les 12h	
	DORAVIRINE			
DOR	PIFELTRO® MSD	1 comprimé (100 mg), 1 fois/jour	toutes les 24h	à prendre au cours ou en dehors d'un repas
	NÉVIRAPINE			
NVP	VIRAMUNE® BOEHRINGER INGELHEIM	1 comprimé (200 mg), 1 fois/jour les 14 premiers jours	toutes les 12h	à prendre au cours ou en dehors d'un repas
		puis 1 comprimé (200 mg), 2 fois/jour	toutes les 12h	
	Génériques de Viramune® BOEHRINGER INGELHEIM	ARROW / MYLAN / SANDOZ / TEVA		
NVP	VIRAMUNE LP® BOEHRINGER INGELHEIM	1 comprimé (400 mg), 1 fois/jour en remplacement des comprimés de VIRAMUNE® 200 mg pris 2 fois/jour ou en relais après 14 jours d'une prise unique de VIRAMUNE® 200 mg	toutes les 24h	à prendre au cours ou en dehors d'un repas
	Générique de Viramune LP® BOEHRINGER INGELHEIM		SANDOZ toutes les 24h	

INHIBITEUR DE FUSION

	ENFUVIRTIDE			
RAL	FUZÉON® ROCHE	1 injection sous-cutanée de 90 mg (1mL) 2 fois/jour toutes les 12h		bien suivre les recommandations de reconstitution du produit et d'injection

INHIBITEURS DE L'INTEGRASE

	RALTÉGRAVIR			
RAL	ISENTRESS® MSD	1 comprimé (400 mg), 2 fois/jour	toutes les 12h	à prendre au cours ou en dehors d'un repas
RAL	ISENTRESS® MSD	2 comprimés (600 mg), 1 fois/jour	toutes les 24h	à prendre au cours ou en dehors d'un repas
	DOLUTÉGRAVIR			
DTG	TIVICAY® VIIV HEALTHCARE	*SELON LE PROFIL VIRAL* — 1 comprimé (50 mg), 1 fois/jour	toutes les 24h	à prendre en dehors ou au cours des repas
		1 comprimé (50 mg), 2 fois/jour **	toutes les 12h	à prendre de préférence au cours d'un repas

BOOSTER

	RITONAVIR			
RTV	NORVIR® ABBOTT	utilisé comme booster de chaque prise d'inhibiteur de protéase, c'est-à-dire pour augmenter la concentration des molécules prises en association	Posologie en fonction de l'antiprotéase associé.	à prendre au cours d'un repas
	Générique de Norvir® MYLAN			

INHIBITEUR DU RECEPTEUR CCR-5

	MARAVIROC			
DTG	CELSENTRI® VIIV HEALTHCARE	1 comprimé (150 mg), 2 fois/jour	toutes les 12h	à prendre au cours ou en dehors d'un repas
		ou 1 comprimé (300 mg), 2 fois/jour	toutes les 12h	
		ou 2 comprimés (300 mg), 2 fois/jour en fonction des antiviraux associés	toutes les 12h	

INHIBITEUR D'ATTACHEMENT

	FOSTEMSAVIR			
FTR	RUKOBIA® VIIV HEALTHCARE	1 comprimé (600 mg) 2 fois/jour	toutes les 12h	à prendre au cours ou en dehors d'un repas

** *Les recommandations de prise sont extraites des RCP (Résumé des Caractéristiques du Produit) publiés par l'ANSM lors de la mise sur le marché des médicaments. Cependant, pour certaines molécules et selon votre profil, il peut parfois être préférable de prendre son traitement en mangeant pour faciliter son absorption. Il est donc conseillé d'en parler avec son médecin ou pharmacien.*

Évaluer nos outils

Commandez nos outils pratiques
www.actions-traitements.org

Ligne d'écoute
01 43 67 00 00
lundi au jeudi de 15h à 18h
ou par mail 7j/7 :
ecoute@actions-traitements.org

Toutes les infos sur vos traitements dans nos Infocartes.

Disponible en grand format sur notre site internet.

Vous prenez d'autres médicaments que des ARV /AAD ? Vérifiez leur compatibilité avec votre traitement grâce à notre Réglette.

Médicaments antirétroviraux
Tableau récapitulatif

Édition Version 2022

FORMES ADULTES DISPONIBLES EN FRANCE

actions traitements
ASSOCIATION DE PATIENTS AGRÉÉE

ACTIONS TRAITEMENTS
23 rue Duris - 75020 PARIS
Tél : 01 43 67 66 00
at@actions-traitements.org
/actionstraitements @Association_AT
/actionstraitements Actions Traitements