

POURQUOI DOIS-JE ME VACCINER ?

Lorsque l'on vit avec le VIH, on est plus vulnérable à certaines infections pouvant être évitées grâce à la vaccination. Ces infections peuvent faire augmenter la charge virale et baisser les CD4. Il est ainsi important de se faire vacciner et d'être à jour de ses vaccins pour se protéger de ces maladies.

LA VACCINATION EST-ELLE OBLIGATOIRE ?

La grande majorité des vaccins n'est pas obligatoire mais fortement recommandée pour les personnes vivant avec le VIH. Certains vaccins peuvent toutefois être totalement ou partiellement contre-indiqués en fonction du taux de CD4 (BCG, fièvre jaune...). En cas de rupture de stock, il est toujours possible de vous faire vacciner car vous faites partie des populations prioritaires. Votre pharmacien peut vous renseigner sur le centre le plus proche où accéder au vaccin. Plus d'infos :

www.vaccination-info-service.fr

OÙ PUIS-JE ME FAIRE VACCINER ?

Vous pouvez vous faire vacciner par votre médecin traitant, par un médecin exerçant dans un centre de vaccinations ou encore par un infirmier (sur délégation médicale).

COMBIEN CELA VA T-IL ME COÛTER ?

En tant que personnes vivant avec le VIH, vous bénéficiez d'une prise en charge à 100% liée à votre affection longue durée (ALD). Cependant, certains vaccins recommandés ou obligatoires pour voyager ne sont pas remboursés.

Plus d'infos : www.vaccination-info-service.fr

ET LES EFFETS INDÉSIRABLES ?

Fièvre, courbatures, fatigue, point d'injection douloureux... Comme pour tous les médicaments, des effets indésirables peuvent apparaître mais disparaissent en général rapidement. Nous vous conseillons d'en discuter avec votre médecin, votre pharmacien ou avec une association de patients.

ET SI JE VOYAGE ?

Comme pour tous les voyageurs, si vous vous déplacez, pensez à vous rendre dans un centre de vaccination pour connaître les vaccins spécifiques à votre destination. Plus d'info : www.pasteur.fr ou www.vaccinations-airfrance.fr

LES VACCINS EN DÉBAT

Il y a eu, ces dernières années, de nombreux débats à propos des vaccins. Les arguments des uns et des autres ont pu semer des doutes sur leur efficacité, leur tolérance et leur composition.

Afin de bien vous informer des bénéfices et des risques, parlez-en à votre pharmacien et à votre médecin infectiologue. Celui-ci vous prescrira les vaccins adaptés à votre situation personnelle et conformes aux recommandations

Bien que certaines maladies aient disparu, la plupart des microbes à l'origine de ces maladies existent toujours et restent un danger pour les personnes non protégées par la vaccination. En ce sens, la vaccination est un acte de prévention collectif. En vous protégeant, vous protégez les autres.

Pour plus d'information sur la vaccination, contacter notre ligne d'écoute : 01 43 67 00 00

« Un doute ? Vérifiez les interactions avec votre traitement ! »

> www.actions-traitements.org/reglette



Ligne d'écoute

01 43 67 00 00

du lundi au vendredi de 15 h à 18 h

Commandez nos outils pratiques en ligne

www.actions-traitements.org/commande

ACTIONS TRAITEMENTS

23 rue Duris - 75020 PARIS

Tél : 01 43 67 66 00

at@actions-traitements.org

[f /actionstraitements](https://www.facebook.com/actionstraitements)

[@Association_AT](https://twitter.com/Association_AT)

[yt Actions Traitements](https://www.youtube.com/channel/UC...)

[@actions_traitements](https://www.instagram.com/actions_traitements)



infovaccin

Édition janvier 2019

Vaccination des adultes vivant avec le VIH




[f /actionstraitements](https://www.facebook.com/actionstraitements) [@Association_AT](https://twitter.com/Association_AT)
[yt Actions Traitements](https://www.youtube.com/channel/UC...) [@actions_traitements](https://www.instagram.com/actions_traitements)





Vaccins recommandés pour les adultes vivant avec le VIH : cf. Rapport Morlat (juillet 2018)

! Un vaccin est optimal si vous avez une charge virale indétectable et un taux de CD4 suffisant. En cas de doute, consultez votre médecin qui vous indiquera si vous pouvez vous faire vacciner.

	Nom commercial	Mon calendrier et schéma de vaccination	Je me protège contre	Date de ma vaccination
dTCaP (diphthérie-tétanos-polio-coqueluche acellulaire)	BoostrixTetra® Repevax®	Schéma : une dose de rappel dTPCa à l'âge de 25 ans puis un rappel dTP tous les vingt ans.	Diphthérie : angine (pharyngite, fièvre, oedème du larynx). Tétanos : contractures musculaires intenses qui peuvent être mortelles. Poliomyélite : attaque le système nerveux (paralysies définitives). Coqueluche : maladie infectieuse respiratoire très contagieuse.	/ /20... Rappels : / /20... / /20...
Grippe saisonnière (infection virale aigüe)	FluarixTetra® Influvac tetra® Vaxigrip tetra® Influvac®	Schéma : 1 injection/an (automne). Lorsque l'infection par le VIH n'est pas contrôlée, il y a risque d'élévation de la charge virale associée à une baisse des CD4.	Troubles généraux : fièvre élevée, fatigue, courbatures, frissons, difficultés respiratoires. Complications infectieuses graves.	/ /20... / /20... / /20...
Hépatite A (maladie aigüe hépatique) Aucun traitement curatif existant	Avaxim 160® Vaqta 50® Havrix® 1440	Fortement recommandé chez les personnes non immunisées en particulier s'il y a déjà une coinfection par une hépatite chronique B ou C. Schéma : une dose puis une 2 ^{ème} six mois après. Effectuer un contrôle d'anticorps 1 à 2 mois après la 2 ^{ème} injection.	Troubles généraux : forte fatigue, perte d'appétit. Troubles digestifs : diarrhées, nausées, gênes abdominales, urines foncées, selles blanches.	/ /20...
Hépatite B (infection grave potentiellement mortelle)	GenhevacB Pasteur® Engerix® B20 HBVaxpro® 10µg	Fortement recommandé chez les personnes non immunisées et après vérification du taux d'anticorps. Schéma : 3 injections double dose espacées d'un mois et 4 ^{ème} injection double dose six mois après la première.	Troubles généraux : fatigue, fièvre, perte d'appétit, douleurs musculaires et articulaires. Troubles digestifs : nausées et vomissements. Maladies aigües ou chroniques du foie pouvant évoluer vers une cirrhose hépatique ou un cancer.	/ /20... Injection 2 : / /20... Injection 3 : / /20... Injection 4 : / /20...
Méningocoque C (infections graves : méningites, septicémie)	Menjugate 10® Neisvac® Nimenrix® Menveo®	Fortement recommandé jusqu'à l'âge de 24 ans. Après 24 ans, chez les personnes fréquentant des lieux de convivialité et de rencontre gay. Schéma : 1 dose	Troubles généraux : fièvre élevée, maux de tête, raideur de nuque accompagnée souvent de vomissements, courbatures et d'une gêne à la lumière. Troubles cutanés : Purpura (tâches rouges ou violacées). Risque de décès et de séquelles neurologiques graves.	/ /20...
Pneumocoque (bactérie à l'origine d'infections graves)	Prévenar 13® (conjugué) Pneumovax® (non conjugué)	Schéma : une 1 ^{ère} injection de Prévenar 13®, puis une 2 ^{ème} de Pneumovax® au moins deux mois après. Fortement recommandé : Risque de transmission accru chez les personnes séropositives.	Pneumonie potentiellement sévère, otite, sinusite, méningite (infection des enveloppes du cerveau), bactériémie (infection du sang).	Injection 1 : / /20... Injection 2 : / /20...
Papillomavirus humains (HPV)	Gardasil 9®	Garçons et filles jusqu'à 19 ans. Fortement recommandé : jusqu'à 26 ans révolus pour les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes. Schéma : 3 doses à 0, 2 et 6 mois	Troubles cutanés : condylomes (verrues génitales) Risque de développement de lésions « précancéreuses », voire de cancers ano-génitaux (anus, vulve, col de l'utérus)	Injection 1 : / /20... Injection 2 : / /20... Injection 3 : / /20...

... **Fortement recommandé pour les personnes ayant des relations sexuelles fréquentes avec des partenaires différents.**